



FONGICIDE ANTI MILDIOU

Quand l'association
devient Synergie



Grow a better tomorrow

FONGICIDE ANTI MILDIOU

La complémentarité d'une molécule pénétrante associée aux atouts du cuivre

Amaline Flow® : fongicide contre le mildiou de la vigne et de la tomate.
Associant deux molécules complémentaires permettant une action
préventive et stoppante.

CARACTÉRISTIQUES

AMM	2090132
MATIÈRE ACTIVE	266,6 g/L (ou 19,2% p/p) de Cuivre du Sulfate de Cuivre Tribasique 40 g/L (soit 2,9% p/p) de Zoxamide
FORMULATION	Suspension Concentrée (SC)
MODE D'ACTION / HRAC	Contact + Ciro pénétrant pour une action préventive de 10 à 12 jours Zoxamide : B3 (FRAC M01, 22)
USAGES ET DOSES	Mildiou de la Vigne : 2,8 L/ha Mildiou de la Tomate (industrielle et de bouche de plein champ) : 2,8 L/ha
DAR	Vigne : 28 jours Tomate de bouche : 3 jours Tomate industrielle : 10 jours
NOMBRE D'APPLICATION	Vigne : 2 applications max. par an (Intervalle minimum entre les applications : 8 à 12 jours) Tomate (industrielle et de bouche de plein champ) : 3 applications max. par an (Intervalle minimum entre les applications : 7 jours)
DRE	24 heures
ZNT	Vigne : 20 mètres Tomate (industrielle et de bouche de plein champ) : 20 mètres (dont DVP 20m)
CLASSEMENT	Attention - EUH208 H302 H319 H410 EUH401



DESCRIPTIF ET BÉNÉFICES

- Une formulation de cuivre élaborée pour une efficacité élevée à faible dose
- Un profil réglementaire favorable non CMR
- Une sécurité renforcée et un outil d'alternance grâce à l'absence de résistance connue à ce jour
- Une persistance d'action accrue et une meilleure résistance au lessivage grâce à son action pénétrante

FONGICIDE ANTI MILDIOU

USAGES HOMOLOGUÉS	CULTURES	DOSES MAX. D'EMPLOI	NOMBRE D'APPLICATIONS MAX./AN	DÉLAI AVANT RÉCOLTE OU STADE D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION BBCH	ZONE NON TRAITÉE AQUATIQUE
Tomate*Trt Part.aérienne*Mildiou(s)	Tomate industrielle et tomate de bouche de plein champ	2,8 L/ha	3 (Intervalle minimum entre les applications : 7 jours)	Tomate industrielle : 10 jours Tomate de bouche : 3 jours	BBCH15 BBCH85	20 mètres (dont DVP* 20m)
Vigne*Trt Part.aérienne*Mildiou(s)	Raisin de cuve, raisin de table, vigne-mères, pépinières viticoles	2,8 L/ha	2 (Intervalle minimum entre les applications : 8 à 12 jours)	28 jours	-	20 mètres

POUR EXPRIMER TOUT SON POTENTIEL,
LA ZOXAMIDE A BESOIN D'UN BON PARTENAIRE

ZOXAMIDE


- ✓ Molécule unisite et synergiste
- ✓ Ciro-pénétrante : résiste à 80 mm de pluie
- ✓ Action préventive et stoppante
- ✓ Aucune résistance connue à ce jour



CUIVRE BROCHANTITE


- ✓ La partie « noble » du sulfate de cuivre
- ✓ Molécule multi-site
- ✓ Excellente couverture du végétal
- ✓ Qualité de formulation : résiste à 50 mm de pluie
- ✓ Nombreuses actions secondaires du cuivre

Comparaison efficacité mildiou :
Synergie de l'association des
deux molécules.



FONGICIDE ANTI MILDIOU

UNE SOLUTION EFFICACE À POSITIONNER
AUSSI BIEN EN DÉBUT QU'EN FIN DE CYCLE



2,8L/ha - Application possible sur toute la campagne – DAR 28 jours

Début de cycle

Positionnement fin de cycle

Application possible sur toute la campagne à 10-12 jours d'intervalle (8-10 jours en cas très forte pression ou croissance de la vigne)

Ne pas dépasser 3 traitements par an à base de zoxamide pour une bonne gestion des modes d'action.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**